



Osnovno održavanje života uz uporabu automatskoga vanjskoga defibrilatora (AVD) prilagođeno pandemiji COVID-19



za educirane zdravstvene djelatnike

Ne odgovara i ne diše normalno

COVID-19

**Procijenite disanje gledanjem;
nemojte otvarati dišni put ili
približavati se nosu i ustima žrtve**



Pozovite Tim za reanimaciju

COVID-19

recite kakav je COVID-19 status



Pokrijte nos i usta žrtve

COVID-19

kirurškom maskom ili maramicom.



**Primijenite AVD što je prije moguće, čak i ako
nosite samo osobnu zaštitnu opremu protiv
kapljica ("droplet-precaution PPE")**



**Obucite osobnu zaštitnu opremu protiv prijenosa
zrakom ("airborne-precaution PPE"),
ukoliko već niste;
razmotrite optimalnu veličinu tima**



Primijenite 30 kompresija na prsni koš



**Primijenite 2 upuha
koristeći masku sa samoširećim balonom
(100% kisik)**

COVID-19

Nikako usta-na-usta ili usta-na masku



Nastavite KPR 30:2



Mijenjajte spašavatelje svake 2 minute

Ventilacija maskom sa samoširećim

Balonom: koristite tehniku sa 2 osobe
(jedna osoba osigurava čvrsto prijanjanje
maske, druga osoba primjenjuje
kompresije i upuhe);
stavite filter za viruse između samoširećeg
balona i maske

COVID-19

Timovi za BLS koji su manje educirani ili nisu sigurni
u ventilaciju maskom sa samoširećim balonom
trebaju postaviti masku s kisikom na lice pacijenta
i provoditi KPR samo kompresijama prsnoga koša

COVID-19